


a Couperon?

suite d'observations sur la cure de l'hygiène


par M. Vignier

chir. de l'hop. d. de Toulouse



ARC 18 d. 5 n° 35

le
fois
a



1.

Supplément
aux observations sur l'hydrocèle, déjà
communiquées à l'académie royale de Chirurgie,
par m. viguerie chirurgien gagnant
maîtrise à l'hôtel dieu de toulouse.

Si j'eusse pu prévoir que l'académie formeroit
des doutes sur mes observations sur l'hydrocèle,
ainsique sur les succès constants de la méthode de
m pott, je les aurois prévenus, en donnant plus
d'étendue à la théorie sur laquelle j'ai taché -
d'établir le véritable caractère de cette maladie,
et en multipliant les preuves des guérisons que
j'ai procurées; mais puis que je n'ai pu convaincre
cette savante société sur ces deux points essentiels
de ma dissertation, je vais essayer de la satisfaire:
heureux si je puis y réussir et mériter par là
son approbation.

I.

de la Réduction de l'hydrocèle.



avec moi, si l'académie convient de la possibilité de
certaines tumeurs, parfaitement semblables
à des hydrocèles, et susceptibles de réduction,
possibilité prise de la disposition du testicule
et de ses enveloppes dans le fœtus et quelquefois
dans les enfans parvenus au terme ordinaire

2.

de la naissance, il doit passer pour vrai que ces tumeurs sont des hydrocèles, si elles portent tous les signes qui caractérisent l'hydrocèle, et l'exclusion de ceux qui font connoître toute autre tumeur humorale, ou qui désignent ~~des~~ hernies: or ce principe posé, jecrois pouvoir conclure que les cinq tumeurs dont j'ai déjà donné l'histoire trop abrégée à l'académie, étoient des véritables hydrocèles, susceptibles de réduction. pour le prouver, je reviens sur mes pas, je vais analyser mes cinq premières observations auxquelles j'en joins ~~une~~ une sixième, et j'espère d'établir si solidement le véritable caractère de la maladie qui en fait le sujet, que l'on ne pourra point la méconnoître, ni la confondre avec toute autre.

1^e observ.

J'avoue que quoique je ne puisse point assurer que l'enfant qui fait le sujet de cette observation portoit une hydrocèle qui rentroit par le taxis, je l'ai pourtant cru, parce que son père qui me le dit, n'avoit aucun intérêt de me tromper; il m'a répété même plusieurs fois qu'il faisoit disparaître journellement cette tumeur, en la maniant: c'est là, me dira-t-on, une preuve équivoque? mais - l'enfant lui-même sera sans doute plus - persuasif (*Veritas ex ore infantium*), il n'a

point cessé de tenir pendant son séjour dans
l'hôtel dieu, le même langage que son père:
en un mot, le témoignage irréfutable de
M^{rs} Dubernard & Gruet médecins ordinaires
de l'hôtel dieu, de M^{rs} Bosc & Carabon,
professeurs, chirurgiens Consultants du dit
hôtel dieu, et de M^r Carrère membre du
collège de chirurgie, imprimera le sceau
de l'évidence et de l'authenticité à cette
observation; ces messieurs ayant questionné
l'un après l'autre, cet enfant sur son état,
il leur Confirma encore ce qu'il avoit dit si
souvent, que son père lui faisoit rentrer
chaque jour son enflure dans le ventre, en
lui pressant les bourses. enfin je l'opérai
par la méthode de M^r Pott, j'évacuai
environ un ponceau de sérosité et il a été
guéri radicalement.

2^e observ.

Lorsque l'enfant qui fait le sujet de cette
observation, me fut présenté, l'on me dit que
sa tumeur disparoissoit et reparoissoit par
intervalle: je crus formellement d'après cet
exposé, qu'elle étoit formée par une hernie
congéniale; mais cet enfant ayant la peau,
le Dartos et la tunique vaginale fort minces,
soit par rapport à son âge, soit à cause de la
tension de ces parties, je jugeai qu'il



et sa tumeur étant transparente, à peu près, comme une bouteille qui contient une eau légèrement trouble, je jugeai d'abord qu'elle étoit une hydrocèle; mais je me confirmai dans mon opinion, en l'examinant avec une bougie allumée, je reconnus sensiblement à la faveur de ce corps lumineux, le véritable caractère de cette tumeur.

cette hydrocèle ne remontoit pas tout à fait jusqu'à l'anneau; je portai mes doigts entre celui-ci et la tumeur et je ne touchai aucune partie solide qui passât à travers l'anneau, comme l'on s'en apperçoit facilement. Dans les hernies; je fus surpris alors de ce que les parents de l'enfant m'assurèrent avoir fait disparaître plusieurs fois cette tumeur; mais je le fus bien d'avantage, lorsque je la vis diminuer ^{à peu} peu et disparaître enfin par le taxis: pour me convaincre encore mieux de sa nature, je plaçai l'enfant debout, je le tracassai pour le faire pleurer et crier et pour déterminer la maladie à reparaitre: peu de temps après j'apperçus sensiblement le bas fond du Scrotum se gonfler, et dans environ l'espace d'un quart d'heure je reconnus très distinctement la sérosité épanchée en assez grande quantité dans cette enveloppe commune des testicules: depuis —

cette époque j'ai vu plusieurs fois, à différens 5.
jours et dans diverses Circonstances, le malade
dans cette alternative; c'est à dire, sa tumeur
se former spontanément et peu à peu, et
disparoître par la plus légère Compression;
reparoître de nouveau, et disparoître encore
par le même moyen; mais aujourd'hui
la tumeur n'est plus susceptible de réduction,
par la raison, sans doute, que n'ayant
appliqué aucun moyen Compressif sur
l'anneau, après avoir repoussé la Sérosité
dans le ventre, le Canal de Communication
entre cette Cavité et le Scrotum, s'est oblitéré
et s'oppose à sa rechute.

3.^e observ.



Le Sujet de cette observation me fut
présenté par un atoch mon ami, élève
en chirurgie qui à l'honneur d'être Comu
de l'Académie: après l'avoir examiné,
je le crus atteint d'une hydrocèle; je fus
authorisé dans mon opinion par le témoignage
du père qui me dit qu'il faisoit disparoître
la tumeur de son fils, en la lui comprimant:
mais pour m'en convaincre, je fermai les
fenêtres de mon Cabinet; je l'observai avec
un atoch à la clarté d'une bougie, et
nous reconnûmes à la faveur de la transparence

6^e

du Scrotum, qu'elle étoit une véritable hydrocèle: son volume n'étoit pas le même dans toutes ses régions, puisqu'elle étoit moins grosse dans la supérieure, que dans l'inférieure: elle se terminoit à un demi pouce loin de l'anneau, je portai le doigt sur cet espace vide, je ne touchai ni l'épiploon, ni l'intestin; je comprimai d'une main la tumeur, je portai le pouce et l'indicateur de l'autre sur l'anneau qui étoit dans son état naturel, pour tâcher d'en reconnoître la Cause matérielle, la tumeur disparut promptement et totalement, sans faire la moindre impression contre mes doigts, placés sur l'anneau, ni me fournir le plus léger signe Caractéristique de sa nature.

Si la tumeur eût été formée par l'épiploon, ou l'intestin, j'en aurois jugé dans le premier Cas, par sa solidité et son inégalité; et dans le second, par son égalité de surface et sa mollesse, et le gargouillement que j'y aurois excité par le taxis, m'auroit fixé infailliblement sur son véritable Caractère.

Mais aucun de ces signes n'ayant paru pendant ce premier examen, je pouvais plus loin mes recherches; je reconnus que le Cordon spermatique, le testicule et l'anneau étoient dans leur état naturel; je placai cet enfant sur ses pieds, je portai

mon doigt bien avant dans l'anneau, je 98
fis tousser le malade et je n'éprouvai point
la plus légère impulsion contre mon doigt;
le scrotum ne grossit point, tant que je
bouchai l'anneau; mais en ayant retiré
mon doigt et fait tousser l'enfant, je vis
peu de temps après, la partie inférieure
de la tunique vaginale se tuméfier,
augmenter peu à peu en volume, et
devenir dans l'espace d'un demi quart
d'heure, aussi grosse qu'elle l'étoit avant
que je la fis disparaître par le taxis.

J'eus l'attention pendant que la
tumeur se renouveloit, de placer mon
doigt au dessous de l'anneau, pour éprouver
sottlement, ou impulsion de la part des
parties qui la formoient; mais je
n'observai ni l'un, ni l'autre: je la
réduisis encore: je réitérai les mêmes
tentatives, je plaçai l'enfant debout,
je le fis tousser et cracher, je touchai
l'anneau, j'observai surtout ce qui se
passoit au dessous, et je n'y trouvai
point ce gonflement solide et plus, ou
moins douloureux qui s'y fait sentir
dans les hernies: je m'assurai constamm²
que le gonflement se manifestoit d'abord



8^e à la partie inférieure de la tunique vaginale, qu'il s'accroissoit et montoit peu à peu jus qu'à la partie moyenne du Cordon spermatique: l'on pouvoit aisément en portant les doigts entre la tumeur et l'anneau, se convaincre qu'il n'y avoit dans cet espace, que la Continuité du Cordon; la tumeur étoit toujours diaphane et elle le devint d'avantage à mesure que tendant le Scrotum, j'en effaçois les rides et en rendois les membranes plus minces et plus délicées.

que Conclusion de toutes ces tentatives, si exactes et si souvent répétées, ce que j'en conclus moi même, une entière Conviction de l'existence d'une hydrocèle. D'après cette idée, et de ce que mon doigt porté dans l'anneau s'opposoit toujours à la chute de la sérosité dans le Scrotum, je crus devoir assujettir l'enfant à l'usage du Brayer, je le remis à son père à qui il appartenoit déjà, il lui appliqua le Bandage qui le guérit radicalement.

4^e observ.

Le malade qui fait le sujet de 9^e cette observation, portoit une tumeur au Scrotum, d'un volume Considérable, lorsque je la vis pour la première fois; elle n'étoit pas aussi transparente que les deux précédentes, mais elle l'étoit assez pour laisser appercevoir le liquide qu'elle renfermoit; elle laissoit un espace suffisant pour que l'on peut toucher le cordon spermatique, et s'assurer qu'elle n'étoit point une hernie: l'anneau n'étoit pas plus dilaté que dans l'état naturel: - lorsqu'on comprimoit la tumeur, elle disparoissoit totalement et sans bruit: je plaçai mes doigts entre elle et l'anneau, mais je ne touchai jamais aucune partie solide qui rentrât, comme cela arrive dans la réduction des hernies; après la disparition de la tumeur je fis lever, tousser et cracher le malade, je posai mes doigts au dessous de l'anneau, j'apperçus sensiblement que la sérosité distilloit, pour ainsi dire, de la Cavité du bas ventre, à travers l'anneau, se déposoit dans

10^e le fond du Scrotum, gonfloit la partie inférieure de la tunique vaginale et renouveloit la tumeur; mais je ne reconnus jamais de gonflement, ni de changement au dessous de l'anneau; enfin je parvins dans ce cas ci, comme dans les précédens, à me convaincre par les mêmes moyens, que la tumeur étoit une véritable hydrocèle.

ce qu'il y a de singulier dans cette observation, c'est que le nommé Darisan qui en fait le sujet, porte sa tumeur fort petite, lorsqu'il jouit d'une bonne santé, qu'au contraire ~~elle augmente~~ ~~en volume~~ ~~lorsqu'il est malade~~ lorsqu'il est malade, elle augmente si considérablement en volume, qu'il est obligé de garder le lit: je l'ai vu il y a environ deux mois, partant pour son régiment, et j'ai apperçu à peine son hydrocèle qu'il contient exactement par un Brayer bien construit; ~~et~~ je ne doute point qu'il ne guérisse radicalement si l'en interrompt point l'usage.

La tumeur dont je parle dans
cette observation, portoit tous les signes
qui caractérisoient son espèce; elle
rentroit par le taxis, il en sortoit un verre
de sérosité par la ponction après laquelle
toutes les parties reprennoient leur état
naturel; elle se formoit de nouveau peu
à peu et avoit acquis dans l'espace de trois
mois son premier volume: l'on pratiquoit
une seconde ponction qui procuroit la
sortie d'une égale quantité de liquide:
troisième apparition de la tumeur dans
le même délai, troisième ponction, même
évacuation; ces trois ponctions furent
pratiquées tantôt par le père, tantôt
par l'oncle du malade, et ils pourroient
attester qu'il dépendoit d'eux de faire
disparoître cette tumeur par le taxis:
le malade parvenu à un âge plus avancé,
n'a plus voulu s'assujettir à la ponction,
il m'a Consulté, je lui ai Conseillé l'usage
d'un Brayer que j'ai ^{à perfectionné} ~~perfectionné~~, ^{le} ~~quel~~ ^{il} l'a guéri
radicalement et ~~qu'il~~ ^{il} ne porte plus déjà
depuis long temps.



un enfant de 12 ans fut conduit à l'hôtel dieu pour une tumeur qu'il portoit au Scrotum depuis sa naissance et qui rentroit: je l'examinai, et après m'être assuré que c'étoit une hydrocèle, je me proposai d'abord de la guérir par la compression: mais venant d'être instruit que l'académie formoit des doutes sur mes premières observations à ce sujet, j'ai cru qu'avant d'employer le moindre moyen curatif, il étoit de mon honneur de les dissiper, et de convaincre l'académie de mon exactitude et de ma véracité; j'ai pour cela, prié messieurs Dubernard & Brunet médecins de l'hôtel dieu, M^r Cazabon & Tarbes chirurgiens, Rigal & Bose premiers et second élèves du dit hôtel dieu, d'examiner la tumeur: ils en ont apperceu la transparence, ils en ont senti la fluctuation, ils ont touché l'anneau et le Cordon spermatique, et ils ^{ont} reconnu que c'étoit une hydrocèle: ils l'ont faite disparaître totalement par le taxis, ils l'ont vue reparoître lorsque l'enfant restoit debout pendant un certain temps, ou qu'il - marchoit, ils l'ont examinée deux matins de suite avant son lever, l'hydrocèle avoit - toujours disparu pendant la nuit et elle se

renouveloit lorsque l'enfant étoit levé. 13^e
enfin pour Convaincre ces messieurs du
véritable Caractère de la tumeur, j'ai plongé
aujourd'hui 2^e mars 1779, sous leur yeux et
en la présence de plus de quarante élèves, un
trocar dans son intérieur; tous ces Spectateurs
en ont vu sortir la sérosité et disparaître
l'hydrocèle. C'est maintenant que je me
servirai du Brayer dont j'attens les mêmes
avantages que j'en ai retiré en pareil cas.

2^o
De la Cure radicale de l'hydrocèle
par la méthode de M. Pott, simplifiée
par Monsieur Sabatier.

Depuis ~~plus~~ 3 ans que j'exerce la
Chirurgie dans Toulouse, j'ai opéré seize
hydrocèles dans l'hôtel Dieu et quatre dans
la ville, par la méthode de M. Pott,
simplifiée par M. Sabatier: quoique ces
vingt malades ayent été guéris radicalement,
la guérison n'a pas été aussi prompte, ni
aussi heureuse chez les uns que chez les autres.

On ne doit point croire aveuglément
ce qu'assure M. Pott, que sa méthode est
toujours exempte d'accidens: l'observation

14^e que m. Sabatier a Consignée dans les mémoires
de l'académie, sur la cure radicale de l'hydrocele,
et celles que je vais rapporter, prouvent le
contraire.

1^o deux malades seulement du nombre des
vingt dont je viens de parler, ont été guéris -
radicalement: en très peu de jours et sans le
moindre accident

2^o tous les autres ont éprouvé une fièvre aiguë,
et une inflammation violente au scrotum, -
accidens qui malgré les saignées fréquentes et -
copieuses, les Cataplasmes anodins et
émolliens, les boissons délayantes et rafraichissantes
et la diète la plus sévère, ont produit une
suppuration abondante dans la tumeur; le
foyer de l'abcès occupoit toute l'étendue de
la tunique vaginale, et le pus s'en écouloit
par les deux orifices de la ponction.

3^o chez certains de ces malades, il s'est formé
une collection purulente entre les tuniques
vaginale et albuginée, je l'ai évacuée par
un coup de lancette et les malades ont été
guéris radicalement dans peu de jours.

4^o plusieurs de mes opérés ont éprouvé une
suppuration si abondante et si longue, qu'ils
ont été obligés de garder le lit, les uns pendant
30 jours, les autres pendant 40 et quelques

autres jusqu'au 50^e

15^e

5^o Le premier des hydrocèles que j'opérai à l'hôtel Dieu, le 5. mars 1748. et que j'ai déjà eu l'honneur d'annoncer à l'académie, ainsi que le suivant, se manifesta sur un homme de 60 ans qui n'avoit jamais eu de hernie, et à la suite d'une toux violente: la tumeur parut d'abord au dessous de l'anneau gauche, elle descendit dans un jour jusqu'à la partie supérieure du testicule qui en étoit entièrement séparé, elle prit une figure pyramidale, un peu plus grosse près du testicule, rétrécie vers l'anneau, et elle devint très douloureuse le 3^e jour de son apparition: la tunique qui contenoit la sérosité étoit tendue comme un ballon et transparente. j'opérai le malade, la suppuration survint et il ne fut guéri radicalement que le 50^e jour après l'opération.

6^o L'hydrocèle du second malade opéré à l'hôtel Dieu le même jour que le précédent, avoit aussi commencé à se manifester subitement au dessous de l'anneau gauche, après un effort violent, en levant un pesant fardeau; elle avoit acquis dans 3 jours cinq pouces de longueur et huit de circonférence;

16^e le testicule étoit flottant dans la sérosité; la tumeur étoit aussi transparente et légèrement douloureuse, elle ne montoit pas jusqu'à l'anneau; l'on touchoit entre celui-ci et la tumeur, le cordon spermatique et l'on s'assuroit qu'il n'étoit accompagné d'aucune partie solide, comme il l'est dans les hernies. j'opérai le malade âgé de 25 ans, la suppuration survint, mais il seut guéri radicalement le 40^e jour.

La promptitude avec laquelle ces deux tumeurs se sont manifestées, et que à raison de ce, l'on pourroit nommer hydrocèles aiguës, les fit prendre par quelques consultants, pour des hernies; mais leur transparence, la facilité de s'assurer en touchant le cordon spermatique et l'anneau, de la nature de leur cause matérielle, et surtout la fluctuation qui y étoit assez sensible, me désignèrent leur véritable caractère, et l'issue de la sérosité par l'opération, imprima le sceau de la conviction à l'idée que je m'en formai au premier coup d'oeil, et qui seut adoptée par mm Dubernard, Brunet et Cazabon.

je n'ai jamais vu chez aucun de ces opérés, la fièvre symptomatique et le gonflement inflammatoire survenir le même jour de

l'opération; mais souvent ces accidens 1^{er}
arrivent le 3^e jour; quelquefois 36 heures
après et presque toujours 48 heures après
l'opération: cela dépend de certaines circonstances
générales, ou particulières, que l'on ne sauroit
prévoir et que je ne puis par conséquent indiquer.

Y^o Monsieur Cazabon mon beau père,
lieutenant de m^e le premier chirurgien du roi,
professeur et démonstrateur royal de physiologie
à Toulouse, opéra par la même méthode le
16. 9^{bre} 1755. un ancien gendarme de la garde,
d'une vieille hydrocèle très volumineuse, qui
ne l'incommodoit que par son poids, parce qu'elle
n'avoit jamais été contenue par un bandage;
le peu d'exactitude que le malade apporta
au régime donna lieu le 3^e jour seulement
après l'opération, à la fièvre, à une soif
ardente, au gonflement inflammatoire
du scrotum et à une suppuration dans son
intérieur: il fallut pour lui donner une libre
issue, inciser le sac et les tégumens dans la
ponction inférieure: les choses allant un
peu mieux, il se développa une fièvre putride
qu'il fallut combattre par de nouveaux
moyens, et malgré tous ces inconvénients, le
malade seut guéri radicalement dans
l'espace de 25 jours, quoiqu'il vint de subir

18.^e un traitement antivénérien de deux mois,
et qu'il seut atteint d'un ulcère scrophuleux
sur le trajet des glandes jugulaires gauches, dont
il seut aussi guéri par m. Cazabon en même
temps que de son hydrocèle.

8. m. Cazabon opéra le 30 gbre 1798. le
fils unique d'un conseiller honnoraire au
parlement de toulouse, d'une vieille hydrocèle,
moins volumineuse que celle du gendarme,
et qui n'avoit jamais été contenue. le malade
avoit eu pendant deux mois avant son opération,
la fièvre intermittente, tantôt tierce, tantôt
quarte: son médecin ordinaire lui prescrivit
un opiat dans la composition duquel le
quinquina, la vieille thériaque et les sch-
fébrifuges entroient en quantité; le malade
en prit à si forte dose, que un mois après
son usage, il éprouva un gonflement-
inflammatoire et pulsatif dans la tumeur,
une tension douloureuse non seulement
dans tout le trajet du cordon spermatique,
mais encore dans toute la région hypogastrique.
La fièvre s'alluma avec ardeur, la bouche
devint aride, la soif inextinguible, l'excrétion
de l'urine difficile; en un mot, le malade
étoit menacé d'une inflammation prochaine
au bas ventre et d'un incendie général; —

M. Cazabon Combattit efficacement 19^e
tous ces accidens graves et allarmans,
par les saignées fréquentes et copieuses,
les amplex boirons délayants et rafraichissans,
les applications anodines et relâchantes,
les lavemens et surtout les bains; mais il ne
peut empêcher la formation d'un abcès dans
le scrotum. le meilleur état du malade
permettant l'opération, M. Cazabon seut
fort surpris d'évacuer environ trois demi setiers
de sérosité purulente; malgré cela son
malade guérit radicalement dans 15 jours.
je puis attester la vérité de ces deux opérations
par M. Cazabon, puisque je l'assistai.

Je désire d'avoir rempli par ce nouveau
détail les vues de l'académie: si j'y ai réussi,
ma satisfaction est complète.

Lorsque j'ai parlé dans ma dissertation
des mauvais effets de la Compression dans les
grandes hémorragies, je n'ai point prétendu
m'élever contre un moyen si efficace et si-
sur, lorsqu'il est employé à propos et par un
praticien méthodique; j'ai voulu seulement
faire part à l'académie de ce que j'avois
observé chez le malade dont j'ai donné
l'histoire.



Le Cas d'une hémorragie n'est pas le seul où la Compression la plus légère et la plus méthodique peut donner lieu à des accidens très graves: je l'ai vue faite sur le péricrane, causer tantôt l'assoupissement, tantôt le délire, tantôt enfin des Convulsions, et ces accidens n'ont cessé que lorsqu'on a débarrassé le Corps ~~Comprimant~~ Comprimant: d'où je conclus que la Compression ne doit être employée qu'avec ménagement et circonspection, et que dans les hémorragies, la ligature lui est préférable.

J'espère que l'Académie voudra bien me croire assez éclairé du flambeau de l'anatomie, pour ne pas confondre les maladies chirurgicales que ma pratique me fournit, et assez prudent, pour ne pas lui en imposer lorsque je lui en communique les observations.

t,
n,

on

b,

Le 24 Mars 1864. Monsieur le Ministre
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint
un rapport sur les travaux de la Commission
chargée d'étudier les questions relatives
à la réorganisation des services
administratifs de la ville de Paris.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre,
l'assurance de ma haute considération.

Le Ministre
M. de la Roche